



**RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR**  
**ISSN 2675-6218**

**GERONTOPSICOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
 COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER**

**GERONTOPSYCOMOTRICITY AND THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON COGNITIVE  
 DECLINE RESULTING FROM ALZHEIMER'S DISEASE**

**GERONTOPSICOMOTRICIDAD Y EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DETERIORO  
 COGNITIVO RESULTANTE DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER**

Jeudson Alves Guimarães<sup>1</sup>, José Olímpio dos Santos<sup>2</sup>, Lenir Santos de Freitas<sup>3</sup>

e3112270

<https://doi.org/10.47820/recima21.v3i11.2270>

PUBLICADO: 11/2022

**RESUMO**

A gerontopsicomotricidade é uma área da psicomotricidade que se dedica ao estudo de intervenções psicomotoras para indivíduos idosos, visando uma boa relação entre habilidades motoras, cognitivas, sociais, psicológicas e afetivas. Com o aumento da população de idosos e da expectativa de vida, destaca-se a importância de as pessoas envelhecerem de forma ativa e saudável. Entre as principais doenças que acometem estes sujeitos, destaca-se a doença de Alzheimer (DA), uma enfermidade neurodegenerativa que causa a perda progressiva de memórias recentes e prejuízos neuromotores. Posto isto, o presente trabalho elencou através de uma revisão indícios sobre a importância da atividade física regular no tratamento e prevenção da DA.

**PALAVRAS-CHAVE:** Gerontopsicomotricidade. Doença de Alzheimer. Atividade física. Tratamento. Prevenção.

**ABSTRACT**

*Gerontopsychomotricity is an area of psychomotricity that is dedicated to the study of psychomotor interventions for elderly individuals, aiming at a good relation between motor, cognitive, social, psychological, and affective abilities. With the increase in the population of the elderly and the life expectancy, the importance of people aging in an active and healthy way stands out. Among the main diseases that affect these subjects, stands out Alzheimer's disease (AD), a neurodegenerative disease that causes progressive loss of recent memories and neuromotor damage. Therefore, the*

<sup>1</sup> Pedagogia – Universidade Luterana do Brasil – (ULBRA), Química – Faculdade Cidade João Pinheiro – (FCJP), Matemática – Centro Universitário Claretiano - (CLARETIANO), Geografia – Faculdade Mozarteum de São Paulo – (FAMOSP) e Física – Centro Universitário Favini – (UNIFAVENI); Especialista em Gênero e Diversidade na Escola – (UFMT), Educação das Relações Étnico-Raciais no Contexto da Educação de Jovens e Adultos – (UFMT), Metodologia do Ensino em Química – (FIJ-RJ), Libras e Educação Inclusiva – (IFMT) e Docência para a Educação Profissional e Tecnológica – (IFES); Mestrando em Educação: Especialização em Formação de Professores – Universidad Europea del Atlántico - Espanha (UNEA), Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (Must University) e Mestrando Nacional Profissional em Ensino de Física pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

<sup>2</sup> Bacharel em Análise de Sistemas/Informática pela Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho junto ao Centro da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Penedo/Alagoas; licenciado em Matemática pela Universidade Tiradentes, Aracaju/SE; Licenciatura Plena em Letras Português/Inglês pelo Instituto Ibra de Caratinga/MG; Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Ibra de Caratinga/MG; Cursando Pedagogia pela Faculdade Campos Elisios/SP; Pós-graduação em Gestão Escolar pela UFS/SE; Pós-graduado em Gestão Escolar (Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção) pelo Centro Universitário Unifaveni (UNIFAVENI); e pós-graduado em Gestão de Redes e Segurança da Informação pela Faculdade de Negócios de Sergipe - FANESE. Pós-graduações Lato Sensu em: Didática e Metodologia o Ensino Superior; Pedagogia Empresarial; Didática e Metodologia do Ensino de Matemática, pela Faculdade São Luís de França, em Aracaju/SE; Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e da Língua Inglesa; Educação Física Escolar e Tecnologia da Informação pelo Instituto Ibra de Caratinga/MG; Cursando pós graduação em Avaliação de Sistemas Educacionais pela Faculdade Campos Elisios/SP. Mestrando em Educação em Formação de Professores pela Universidad Europea del Atlántico - UNEATLÁNTICO (ESPAÑA), mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação na Must University (USA) e mestrando em Educação em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Sergipe - (UFS/SE).

<sup>3</sup> Graduada em Pedagogia pela Universidade Anhanguera - Uniderp. Pós-Graduada lato senso em Educação Especial com Ênfase em práticas Inclusivas - Centro de Ensino Superior Dom Alberto, Neuropsicopedagogia - Centro Universitário Leonardo da Vinci e mestranda em Educação: Especialização em Formação de Professores-Universidade Europea del Atlántico – Espanha (UNEA).



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSICOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

*present study lists through a review clue about the importance of regular physical activity in the treatment and prevention of AD.*

**KEYWORDS:** *Gerontopsychomotricity. Alzheimer's disease. Physical activity. Treatment. Prevention.*

### RESUMEN

*La gerontopsicomotricidad es un área de psicomotricidad que se dedica al estudio de las intervenciones psicomotoras para personas mayores, con el objetivo de una buena relación entre las habilidades motoras, cognitivas, sociales, psicológicas y afectivas. Con el aumento de la población anciana y la esperanza de vida, destaca la importancia de que las personas envejeczan de forma activa y saludable. Entre las principales enfermedades que afectan a estos sujetos, destaca la enfermedad de Alzheimer (EA), una enfermedad neurodegenerativa que causa pérdida progresiva de recuerdos recientes y daño neuromotor. Dicho esto, el presente estudio se evidenció al revisar la importancia de la actividad física regular en el tratamiento y la prevención de la EA.*

**PALABRAS CLAVE:** *Gerontopsicomotricidad. Alzheimer. Actividad física. Tratamiento. Prevención.*

### INTRODUÇÃO

A evolução das ciências médicas, tecnologias e políticas públicas dedicadas ao campo da saúde influenciaram drasticamente na expectativa de vida da população. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre o período de 1940 até 2016, a longevidade da população brasileira aumentou em média 30 anos. Atualmente, a expectativa média de vida no Brasil é de 75 anos (HOSPITAL SÃO CAMILO *et al.*, 2018).

Não há dúvida de que houve um crescimento exponencial da população de idosos no mundo de forma geral, sendo assim, doenças relacionadas à idade aumentam dramaticamente. Um dos distúrbios mais comuns relacionados à idade avançada é a demência, sendo a doença de Alzheimer (DA) a causa mais comum e que vem sendo estudada a partir de várias áreas do conhecimento (biomarcadores, estrutura cerebral, comportamento e comprometimento cognitivo).

Para envelhecer de forma ativa e saudável recomenda-se uma série de hábitos saudáveis envolvendo uma alimentação equilibrada, redução do consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, diminuição do estresse psicológico – evitando situações estressantes ou até mesmo através de tratamento psicoterapêutico, realizar consultas médicas periódicas e praticar exercícios físicos regularmente.

É do conhecimento comum que a atividade física regular deve fazer parte de um estilo de vida saudável em todas as faixas etárias. Os benefícios de saúde relacionados ao exercício físico são muitos, até mesmo durante a terceira idade. O potencial efeito positivo da atividade física sobre a cognição de pessoas idosas tornou-se um foco oportuno na literatura, dando outro significado ao “envelhecimento” (DORNELLES, 2003).

Diversos estudos têm mostrado que a atividade física regular traz melhorias significativas para a saúde e qualidade de vida em indivíduos idosos, além de diminuir ou impedir o declínio



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSICOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

funcional associado ao envelhecimento. Com relação à DA, muitas pesquisas relatam que o exercício físico está associado a taxas mais baixas de rebaixo cognitivo típicos dessa enfermidade.

Ao longo do tempo, houve muito esforço da comunidade científica para identificar precocemente indivíduos que estão em risco para DA. Vários estudos visam testar intervenções com objetivo de atrasar a progressão dos sintomas para a demência completa. Os resultados de pesquisas científicas observacionais sugerem que pessoas idosas que demonstram frequentemente perda progressiva de memória ou evidenciam algum tipo de comprometimento cognitivo, estão mais propensos a desenvolver Alzheimer futuramente. A prática de atividade física regular está associada à redução da incidência de demência em ambos os sexos (POIRIER; GAUTHIER, 2016).

A partir destes pressupostos teóricos, o presente trabalho, de cunho bibliográfico, teve como objetivo ressaltar a importância da gerontopsicomotricidade e revisar na literatura científica pesquisas significativas que evidenciam contribuições da prática de atividade física regular sobre o declínio cognitivo de indivíduos idosos diagnosticados com DA. É magnífico o fato das pessoas terem a possibilidade de uma vida longa, porém, certos cuidados para que a longevidade aconteça de forma natural e saudável são necessários, principalmente em relação ao desenvolvimento neurológico, sendo assim, destaca-se a importância desta pesquisa, uma vez que a mesma esclarece de forma clara e objetiva os benefícios da realização de exercícios físicos regulares na redução dos sintomas cognitivos típicos da DA e na prevenção desta enfermidade.

### 2 VISÃO GERAL SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER

A primeira descrição oficial de DA aconteceu em 1906, por um importante psiquiatra alemão da época, chamado Alois Alzheimer, o qual teve seu feito homenageado no nome da doença, dando origem ao termo “doença de Alzheimer”. O primeiro caso descrito foi de uma mulher que apresentava um conjunto de sintomas relacionados à perda de memória, deterioração de habilidades cotidianas e alterações comportamentais. Após a morte desta paciente, Dr. Alzheimer realizou estudos *post-mortem* com o sistema nervoso central da mesma, identificando alterações neuroanatômicas incomuns (LOPES; BOTTINO, 2002).

A DA é caracterizada como uma doença neurodegenerativa e progressiva, a qual causa perda gradativa de memórias recentes e rebaixamento do funcionamento cognitivo. Geralmente, os primeiros sintomas ocorrem no final da vida adulta. Ainda não existe um consenso na comunidade científica sobre a etiologia dessa enfermidade. Achados neuropatológicos apontam como possível causa o alto acúmulo intracelular de proteína amilóide. No entanto, nem todos os indivíduos que apresentam essa condição neuropatológica prototípica manifestam os sintomas clínicos de demência.

Dentre os fatores de risco destaca-se o histórico familiar, nível de escolaridade, engajamento social, desenvolvimento cognitivo e traumatismo cranioencefálico. No entanto, o fator risco principal é a idade avançada.



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

A heterogeneidade dos sintomas é muito ampla, mas a manifestação comum entre todos os casos é a incapacidade insidiosa em se lembrar de informações recentes. À medida que neurônios em diversas partes do sistema nervoso central apresentam baixo funcionamento e morrem, outros sintomas se desenvolvem, incluindo uma perda grave de memória que pode afetar as atividades da vida diária, dificuldades na solução de problemas, desorientação, falta de noção visual-espacial e complicações psicomotoras progressivas. Eventualmente, podem ocorrer problemas neuropsiquiátricos, tais como alterações de humor e personalidade (CAIXETA, 2009).

Conforme a progressão da doença, é comum a manifestação de sintomas cognitivos, incluindo dificuldades psicomotoras progressivas,

O diagnóstico em sua maior parte é clínico e envolve a obtenção de um bom histórico que inclua informações médicas, familiares e neuropsiquiátricas. Exames laboratoriais são essenciais para descartar outras causas de demência (hemograma completo, amplo painel metabólico, hormônio estimulante da tireoide, vitamina B12 e ácido fólico), bem como exames de neuroimagens com ressonância magnética (RM). O diagnóstico pode ser reforçado com testes neuropsicológicos e sorologias para biomarcadores, conforme necessário. Os biomarcadores, atualmente, podem ser obtidos do sangue ou do líquido cefalorraquidiano. Os principais biomarcadores do líquido cefalorraquidiano apresentam alta precisão diagnóstica, com sensibilidade e especificidade de 85% a 90%.

O tratamento farmacológico atual envolve inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas do receptor N-metil D-aspartato (memantina), os quais contribuem minimamente nos estágios iniciais da doença, retardando a progressão da DA em estágios posteriores e fornecem algum alívio sintomático, mas não alcançam uma cura definitiva. Por estas razões, o exercício físico tem sido explorado como um meio viável de prevenção e tratamento para doença em estágio inicial e tardio, devido à sua relativa segurança e poucos efeitos colaterais (CARPER, 2015).

### 3 CONCEITUALIZAÇÃO DE GERONTOPSIKOMOTRICIDADE

Antes de conceituar a gerontopsicomotricidade é preciso entender o significado do conceito de psicomotricidade, uma vez que a primeira é uma subdivisão da segunda. A psicomotricidade é compreendida como uma ciência que se dedica aos estudos pertinentes da relação entre o corpo e a mente. Nesse sentido, o ser humano é visto como um todo: movimentos corporais, sentimentos, pensamentos, emoções e contexto social.

As intervenções psicomotoras visam compreender uma pessoa em vários de seus aspectos, incluindo as capacidades motoras, psicoemocionais, cognitivas e sociais – tudo isso para elaborar o plano de intervenção mais ideal para cada caso. Estas intervenções podem ser lúdico-terapêuticas, exercícios expressivos, relaxação e atividades motoras.

A gerontopsicomotricidade, por sua vez, é exclusivamente dedicada aos indivíduos da terceira idade, permitindo ao geronte ou idoso desenvolver habilidades psicomotoras de forma



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSICOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

terapêutica e preventiva através de terapias não farmacológicas, as quais estudam o movimento corporal de pacientes idosos e sua relação com aspectos psicológicos e afetivos.

O psicomotricista que atua na área da gerontopsicomotricidade trabalha com objetivo de neutralizar ou minimizar a retrogênese psicomotora, a diminuição das capacidades cognitivas, a perda de capacidades sensoriais, os problemas emocionais e afetivos. Essa ciência, cada vez mais, vem ganhando importância ao longo do tempo, uma vez que a mesma de forma simples eleva a importância de valores psicoafetivos por meio de atividades lúdicas e interativas, permitindo um envelhecimento ativo e saudável.

É importante ressaltar que a gerontopsicomotricidade desempenha um papel importante no retardo dos sintomas de determinadas doenças, incluindo mal de Parkinson, síndrome pós-queda, acidente vascular cerebral, depressão, ansiedade, problemas na motricidade (marcha, coordenação, equilíbrio e ocorrência de quedas), doença de Alzheimer etc.

As intervenções psicomotoras em pessoas idosas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As primárias visam prevenir possíveis doenças que surgem ao longo do envelhecimento. As secundárias têm como principal característica a reabilitação, atuando em sujeitos ligeiramente problemáticos a nível cognitivo e/ou funcional, desenvolvendo as capacidades ainda preservadas e estimulando as que estão em processo de deterioração. As terciárias ocorrem nos casos em que já existe um diagnóstico estabelecido, nos quais os sintomas cognitivos e funcionais estão mais evidentes, visando o retardo deles e ao mesmo tempo promover a autonomia em atividades cotidianas e a qualidade de vida (FONSECA, 1988).

#### **4 ATIVIDADE FÍSICA REGULAR COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: VISANDO ATRASAR OU MINIMIZAR O DECLÍNIO COGNITIVO EM PESSOAS IDOSAS DIAGNOSTICADAS COM A DOENÇA DE ALZHEIMER**

Um tratamento terapêutico para a DA deve estar focado em melhorar a qualidade de vida, detendo o declínio mental e promovendo a auto-estima do paciente. Além disso, as atividades terapêuticas para essa população precisam proporcionar prazer imediato, restabelecer a dignidade humana, fornecer tarefas significativas, restaurar papéis do cotidiano e possibilitar o convívio social (MARSHALL; HUTCHINSON, 2001).

Dado o potencial de efeitos colaterais dos medicamentos, tem havido um grande interesse no tratamento não farmacológico (STRÖHLE *et al.*, 2015). Tratamentos como o treinamento cognitivo e estimulação cognitiva demonstraram benefícios mistos e inconsistentes (SZETO; LEWIS, 2016). O exercício físico regular, por sua vez, mostrou-se promissor na prevenção e no tratamento de DA e outros tipos de demência.

Pessoas idosas com vários níveis de comprometimento cognitivo podem se beneficiar de exercícios multimodais, sistematizados e supervisionados, quando praticados num intervalo de aproximadamente 60 minutos por dia, de 2 a 3 dias por semana, para melhorar a funções físicas e



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSICOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

psíquicas. O exercício físico melhora a força, equilíbrio, mobilidade e resistência em pessoas com comprometimento cognitivo e demência (LAM *et al.*, 2018).

Em 2006, na Universidade Paulista (UNESP) de Rio Claro, foi criado um projeto de extensão do Departamento de Educação Física, denominado de “Programa de Cinesioterapia Funcional e Cognitiva em Idosos com Doença de Alzheimer” (PRO-CDA). O objetivo deste projeto é de propiciar aos pacientes participantes os benefícios obtidos através da prática regular de atividade física para a melhoria dos sintomas progressivos da DA, visando à qualidade de vida deles e de seus cuidadores. A equipe que comanda o programa é composta por profissionais das áreas da Educação Física, Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Psiquiatria, além de contar com estagiários graduandos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia (GARUFFI *et al.*, 2011).

Uma amostra de 16 idosos diagnosticados com DA, sendo que sete pertenciam ao grupo controle, foram submetidos a um estudo com objetivo de analisar os efeitos de um programa composto por diferentes tipos de atividades físicas regulares, sistematizadas e supervisionadas sobre as funções executivas, risco de queda e equilíbrio. As intervenções aconteceram três vezes por semana, em um período de seis meses. Cada sessão durou aproximadamente 60 minutos, as quais visaram à estimulação motora e cognitiva, simultaneamente ou isoladamente, incluindo atividades de alongamento, dança, relaxamento, ludicidade, circuitos, prática de esportes e treinamento com pesos. A partir dos resultados, os pesquisadores concluíram que a corporeidade exercida regularmente de forma sistemática e supervisionada é uma ótima abordagem não-farmacológica, beneficiando as funções cognitivas, equilíbrio e risco de quedas. Além do mais, foi evidenciado que a agilidade e o equilíbrio estão relacionados com funções executivas em idosos com Alzheimer (HERNANDEZ *et al.*, 2010).

Diversas pesquisas realizadas nas últimas décadas sugerem que num futuro próximo a prevenção da DA será baseada em regras que regem os hábitos de vida, incluindo uma dieta saudável, estímulos cognitivos e exercícios físicos. Vários fatores, em especial a atividade física, podem contribuir na prevenção do declínio cognitivo e retardar o início da demência, ou seja, uma vida ativa confere um efeito protetor sobre o funcionamento cerebral dos idosos, retardando o curso dos sintomas (ROLLAND; KAN; VELLAS, 2008).

[...] a prática regular de atividade física sistematizada, preferencialmente associada à estimulação cognitiva, contribui para a preservação ou mesmo melhora temporária de várias funções cognitivas, particularmente de atenção, funções executivas e linguagem, em pacientes com DA. Diante da relevância do tema e dos desafios ao tratamento desta doença, a prática regular de atividade física sistematizada representa uma intervenção não farmacológica benéfica para estes pacientes. Há a necessidade de novos estudos controlados para se aferir quais procedimentos concomitantes de intervenção motora e de estimulação cognitiva seriam mais apropriados como recursos adicionais ao tratamento na DA. (COELHO *et al.*, 2009, p. 6).

A literatura epidemiológica fornece evidências convincentes de que maiores quantidades de atividade física estão associadas ao risco reduzido de demência na terceira idade. Além disso,



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

intervenções randomizadas utilizando ferramentas de neuroimagem relataram que a prática de atividade física está associada ao aumento de atividade neurológica em diversas regiões do sistema nervoso central, incluindo o cortex pré-frontal e o hipocampo, o que pode levar a uma redução nos prejuízos da memória. Estudos longitudinais utilizando ferramentas de neuroimagem também mostram que o volume de áreas cerebrais pré-frontais e hipocampais é maior em indivíduos que se engajaram em atividade física precocemente durante a vida.

O fluxo sanguíneo cerebral é adversamente afetado com o avanço da idade e está associado à cognição. O exercício físico regular, mesmo que praticado em intensidade moderada, demonstra resultados significativos no aumento do fluxo sanguíneo no sistema nervoso central (BARNES; YAFFE, 2011). Um estudo identificou maiores níveis de circulação sanguínea no cérebro de homens empenhados em atividades físicas regulares quando comparado com homens sedentários (BAILEY *et al.*, 2013). Comparações de exames de ressonância magnética e medidas fisiológicas, realizados em idosos, antes e depois da prática de exercícios aeróbicos, mostram um aumento do fluxo sanguíneo cerebral em regiões neurológicas associadas à função executiva e memória (KUSTER *et al.*, 2016).

A atividade física em um ambiente favorável estimula o cérebro em um nível corporal e cognitivo e é benéfica para a plasticidade cerebral (capacidade neuronal de mudar e adaptar-se como resultado da experiência) em pacientes com demência. Embora a demência seja uma doença incurável, sua progressão pode ser retardada através de múltiplas atividades (ZENG *et al.*, 2016).

Exercitar o corpo de forma sistemática promove a neuroplasticidade, principalmente quando se trata de atividades que envolvem a combinação de habilidades mentais e físicas, associadas aos circuitos cerebrais cognitivo-associativos. Quando a atividade física é incrementada com estímulos cognitivos de maneira controlada, a auto-organização e a conectividade entre os sistemas cerebrais aumentam. Tal intervenção tem demonstrado benefícios significativos em idosos diagnosticados com DA em habilidades pertinentes à função executiva (GUERRA *et al.*, 2017).

Os benefícios de atividades físicas realizadas regularmente estão relacionados à maximização da função cognitiva, logo, cada vez mais esta prática é reconhecida por promover a saúde mental e como um grande potencial no combate a DA, oferecendo uma intervenção de baixo custo e baixo risco e que está amplamente disponível, podendo ter efeitos transformadores no quadro sintomático. Demonstrar que o engajamento em atividade física altera o curso dos sintomas, tem enormes implicações na saúde pública das pessoas idosas (VIDONI *et al.*, 2012).

Sobol e sua equipe ministraram um estudo no qual participaram 200 idosos com Alzheimer, sendo a idade média da amostra de 71 anos. O objetivo foi de identificar os diversos benefícios dos exercícios aeróbicos sistematizados em pessoas idosas quanto à progressão dos sintomas da doença. Cada sessão durou aproximadamente uma hora, ocorrendo três vezes por semana em um período de três meses. Após todas as sessões, testes clínicos identificaram avanços na aptidão



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

cardiorrespiratória, desempenho físico em tarefas cotidianas e melhorias na realização de tarefas simultâneas (SOBOL *et al.*, 2016).

Um determinado estudo foi realizado com objetivo de investigar os benefícios de exercícios aeróbicos para a melhoria de habilidades da função executiva em uma amostra de 28 idosos com diagnóstico para DA, sendo a média de idade entre eles foi de 78 anos. Através de testes psicológicos e entrevistas com os pacientes, conclui-se que a atividade aeróbica praticada regularmente é uma intervenção eficaz na manutenção da função executiva dessa população, além do mais, evidenciou-se uma redução significativa no declínio da cognição global (YU; VOCK; BARCLAY, 2018).

Um grupo de pesquisadores desenvolveu um estudo com objetivo de identificar possíveis melhorias na vida de pessoas diagnosticadas com algum tipo de demência – incluindo a DA, através de exercícios físicos proporcionados pela locomoção em bicicletas. A amostra estudada foi composta por 51 indivíduos idosos, os quais pedalarão por 15 minutos diários durante um período de 15 meses. Por meio de testes clínicos percebeu-se que houve avanços significativos na função executiva, melhorias nos sintomas neuropsiquiátricos, memória e mobilidade funcional. Outro aspecto importante desta pesquisa foi de que os exercícios praticados conferiram maior efeito naqueles sujeitos que tinham um quadro mais grave de comprometimento cognitivo (CANCELA *et al.*, 2016).

Alguns pesquisadores atribuem outros benefícios para atividades físicas, incluindo alterações positivas na neurogênese e a formação de novas redes neurais (SHEN; LI, 2016). A neurogênese do hipocampo em adultos é crucial para o aprendizado e memória (RYAN; NOLAN, 2016). O hipocampo é reconhecido como uma região neural de extrema importância para um envelhecimento saudável, pois o mesmo é fortemente relacionado com memórias de curto e longo prazo. Portanto, há evidências convincentes de que a atividade física tem uma relação importante com regiões cerebrais implicadas no declínio cognitivo, as quais estão associadas ao avanço da idade e aos sintomas do Alzheimer (ERICKSON; WEINSTEIN; LOPEZ, 2012).

Circuitos hipocâmpais também são considerados muito importantes para a memória episódica, os quais são afetados na DA durante a fase inicial dos sintomas. Acredita-se que grandes volumes hipocâmpais estejam associados a um melhor funcionamento cognitivo. A prática de exercícios leves e moderados apontam para uma possível prevenção de atrofia no volume do hipocampo. Além disso, o desenvolvimento hipocâmpal também está correlacionado com as alterações da aptidão cardiovascular (DUZEL; PRAAG; SENDTNER, 2016).

Lourenço *et al.*, (2019) ministraram um estudo com objetivo de estabelecer uma relação entre o hormônio irisina e atividade física com a DA, levando em consideração a plasticidade cerebral e a memória, utilizando humanos e modelos experimentais. No corpo humano, a síntese de irisina é estimulada pela prática de exercícios físicos. Este hormônio é detectado em quantidades reduzidas no líquido cefalorraquidiano e no hipocampo de idosos com DA e em camundongos sedentários. A irisina participa ativamente na estimulação de uma proteína muito importante ao funcionamento do



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudison Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

hipocampo, a BDNF. Desse modo, conclui-se que irisina atua como fator de neuroproteção, influenciando a função executiva.

Quando um vetor que expressa produção de irisina no cérebro é injetado via intravenosa em camundongos, após certo tempo, detecta-se um aumento no córtex e no hipocampo, sugerindo que administrar doses periféricas do vetor faz com que o mesmo atinja o sistema nervoso central e desencadeie o aumento exponencial de irisina, sendo assim, parecendo uma estratégia formidável naqueles casos em que praticar atividade física seja algo inviável, ressaltando a importância desse hormônio para um possível tratamento farmacológico ou induzido em pacientes com DA.

### 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gerontopsicomotricidade é uma área muito importante da psicomotricidade, a qual trabalha de forma terapêutica e preventiva a população idosa. Apesar do caráter predominantemente preventivo desta ciência, ela também pode atuar na reabilitação de gerontes com demência, principalmente quando se trata da DA. Partindo desse pressuposto, conclui-se que a gerontopsicomotricidade é competente em estimular sujeitos idosos para a descoberta de seus próprios corpos, ou seja, os motivando para realização de diferentes atividades, promovendo a manutenção e/ou recuperação da autonomia, além de desenvolver neles a capacidade relacional.

A partir desta pesquisa, foi possível perceber que o envelhecimento humano é um processo contínuo e gradual, contemplando alterações naturais que se intensificam no final da fase adulta – a terceira idade. O organismo com o passar da idade sofre mudanças que são normais, esperadas e inevitáveis, principalmente em relação ao declínio cognitivo. No entanto, alguns idosos não envelhecem cognitivamente dentro da normalidade, porque são mais propensos a desenvolverem quadros clínicos de demência, levando-os a uma perda acelerada da capacidade cognitiva, afetando diversas áreas do funcionamento neurológico, incluindo a memória de curto prazo, função executiva, noção visual-espacial etc.

Profissionais da área da Educação Física em parceria com profissionais da Medicina, não devem medir esforços a fim de buscar intervenções promissoras e no desenvolvimento de pesquisas visando um envelhecimento ativo e saudável. Ao que tudo indica, envelhecer de maneira bem-sucedida requer um equilíbrio entre envelhecimento cognitivo e envelhecimento biológico.

A atividade física, por sua vez, mostrou-se como uma grande aliada no retardo das deteriorações que acontecem nos sistemas neurológicos e que estão relacionadas à DA. Portanto, a prática regular e sistemática de exercitar o corpo é de extrema importância para a manutenção destes sistemas, evitando ao máximo a evolução para limitações cognitivas e funcionais.

### REFERÊNCIAS

BAILEY, D. M. *et al.* Elevated aerobic fitness sustained throughout the adult lifespan is associated with improved cerebral hemodynamics. **Stroke**, v. 44, n. 11, p. 3235-3238, 2013. Disponível em: [bit.ly/2KAdb9](https://bit.ly/2KAdb9). Acesso em: 13 jun. 2019.



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudson Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

BARNES, D. E.; YAFFE, K. The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence. **The Lancet Neurology**, v. 10, n. 9, p. 819-828, 2011. Disponível em: [bit.ly/2IGQHCC](http://bit.ly/2IGQHCC). Acesso em: 13 jun. 2019.

CAIXETA, L. **Doenças de Alzheimer**. São Paulo: Artmed Editora, 2009.

CANCELA, J. M. *et al.* Effects of a long-term aerobic exercise intervention on institutionalized patients with dementia. **Journal of science and medicine in sport**, v. 19, n. 4, p. 293-298, 2016. Disponível em: [bit.ly/2xePpls](http://bit.ly/2xePpls). Acesso em: 05 jun. 2019.

CARPER, J. **100 dicas simples para prevenir o Alzheimer**. São Paulo: Sextante, 2015.

COELHO, F. G. M. de C. *et al.* Atividade Física e Desempenho Cognitivo em Idosos com Demência de Alzheimer: Uma Revisão Sistemática. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 31, n. 2, 2009. Disponível em: [bit.ly/2X64DyO](http://bit.ly/2X64DyO). Acesso em: 24 jun. 2019.

DORNELLES, B. **Investindo no envelhecimento saudável**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.

DUZEL, E.; PRAAG, H. V.; SENDTNER, M. Can physical exercise in old age improve memory and hippocampal function?. **Brain**, v. 139, n. 3, p. 662-673, 2016. Disponível em: [bit.ly/2Ry98M](http://bit.ly/2Ry98M). Acesso em: 13 jun. 2019.

ERICKSON, K. I.; WEINSTEIN, A. M.; LOPEZ, Oscar L. Physical activity, brain plasticity, and Alzheimer's disease. **Archives of medical research**, v. 43, n. 8, p. 615-621, 2012. Disponível em: [bit.ly/2xePuvK](http://bit.ly/2xePuvK). Acesso em: 04 jun. 2019.

FONSECA, V. da. Gerontopsicomotricidade: uma abordagem ao conceito da retrogênese psicomotora. **Fonseca V. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese**. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 343-81, 1998.

GARUFFI, M. *et al.* Atividade física para promoção da saúde de idosos com doença de Alzheimer e seus cuidadores. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 16, n. 1, p. 80-83, 2011. Disponível em: [bit.ly/2KCFMk](http://bit.ly/2KCFMk). Acesso em: 24 jun. 2019.

GUERRA, Y. de S. *et al.* Ejercicio y enfermedad de Alzheimer: el cuerpo como un todo. **Revista Andaluza de Medicina del Deporte**, v. 10, n. 3, p. 120-124, 2017. Disponível em: [bit.ly/2YeBvCi](http://bit.ly/2YeBvCi). Acesso em: 04 jun. 2019.

HERNANDEZ, S. S. S. *et al.* Efeitos de um programa de atividade física nas funções cognitivas, equilíbrio e risco de quedas em idosos com demência de Alzheimer. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, v. 14, n. 1, 2010. Disponível em: [bit.ly/2XA1wi4](http://bit.ly/2XA1wi4). Acesso em: 24 jun. 2019.

HOSPITAL SÃO CAMILO *et al.* **5 passos para ter um envelhecimento saudável**. São Paulo: Hospital São Camilo, 2018. Disponível em: [bit.ly/2x9fLf9](http://bit.ly/2x9fLf9). Acesso em: 25 jun. 2019.

KÜSTER, O. C. *et al.* Cognitive change is more positively associated with an active lifestyle than with training interventions in older adults at risk of dementia: a controlled interventional clinical trial. **BMC psychiatry**, v. 16, n. 1, p. 315, 2016. Disponível em: [bit.ly/2NpQBnB](http://bit.ly/2NpQBnB). Acesso em: 11 jun. 2019.

LAM, F. M. H. *et al.* Physical exercise improves strength, balance, mobility, and endurance in people with cognitive impairment and dementia: a systematic review. **Journal of physiotherapy**, v. 64, n. 1, p. 4-15, 2018. Disponível em: [bit.ly/2Xt3TU1](http://bit.ly/2Xt3TU1). Acesso em: 05 jun. 2019.



## RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DECLÍNIO  
COGNITIVO DECORRENTE DA DOENÇA DE ALZHEIMER  
Ueudson Alves Guimarães, José Olímpio dos Santos, Lenir Santos de Freitas

LOPES, M. A.; BOTTINO, C. M. C. Prevalência de demência em diversas regiões do mundo: análise dos estudos epidemiológicos de 1994 a 2000. **Arq neuropsiquiatr**, v. 60, n. 1, p. 61-9, 2002. Disponível em: [bit.ly/2X2W2be](http://bit.ly/2X2W2be). Acesso em: 06 jun. 2017.

LOURENÇO, M. V. *et al.* Exercise-linked FNDC5/irisin rescues synaptic plasticity and memory defects in Alzheimer's models. **Nature medicine**, v. 25, n. 1, p. 165, 2019. Disponível em: [bit.ly/2YfiLSR](http://bit.ly/2YfiLSR). Acesso em: 27 jun. 2019.

MARSHALL, M. J.; HUTCHINSON, S. A. A critique of research on the use of activities with persons with Alzheimer's disease: A systematic literature review. **Journal of Advanced Nursing**, v. 35, n. 4, p. 488-496, 2001. Disponível em: [bit.ly/31PjexD](http://bit.ly/31PjexD). Acesso em: 04 jun. 2019.

POIRIER, J.; GAUTHIER, S. **Doença de Alzheimer: o guia completo**. Belo Horizonte: MG Editores, 2016.

ROLLAND, Y.; KAN, G. A. V.; VELLAS, B. Physical activity and Alzheimer's disease: from prevention to therapeutic perspectives. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 9, n. 6, p. 390-405, 2008. Disponível em: [bit.ly/2RBBWUK](http://bit.ly/2RBBWUK). Acesso em: 04 jun. 2019.

RYAN, S. M.; NOLAN, Y. M. Neuroinflammation negatively affects adult hippocampal neurogenesis and cognition: can exercise compensate?. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 61, p. 121-131, 2016. Disponível em: [bit.ly/2X1pZsc](http://bit.ly/2X1pZsc). Acesso em: 13 jun. 2019.

SHEN, Y.; LI, R. What do we know from clinical trials on exercise and Alzheimer's disease?. **Journal of sport and health science**, v. 5, n. 4, p. 397-399, 2016. Disponível em: [bit.ly/2ZKSSLm](http://bit.ly/2ZKSSLm). Acesso em: 11 jun. 2019.

SOBOL, N. A. *et al.* Effect of aerobic exercise on physical performance in patients with Alzheimer's disease. **Alzheimer's & Dementia**, v. 12, n. 12, p. 1207-1215, 2016. Disponível em: [bit.ly/2XvbgdA](http://bit.ly/2XvbgdA). Acesso em: 05 jun. 2019.

STRÖHLE, A. *et al.* Drug and exercise treatment of Alzheimer disease and mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis of effects on cognition in randomized controlled trials. **The American Journal of Geriatric Psychiatry**, v. 23, n. 12, p. 1234-1249, 2015. Disponível em: [bit.ly/2x9SWrL](http://bit.ly/2x9SWrL). Acesso em: 11 jun. 2019.

SZETO, J. Y. Y.; LEWIS, S. J. G. Current treatment options for Alzheimer's disease and Parkinson's disease dementia. **Current neuropharmacology**, v. 14, n. 4, p. 326-338, 2016. Disponível em: [bit.ly/2XE7Sxf](http://bit.ly/2XE7Sxf). Acesso em: 11 jun. 2019.

VIDONI, E. D. *et al.* A community-based approach to trials of aerobic exercise in aging and Alzheimer's disease. **Contemporary clinical trials**, v. 33, n. 6, p. 1105-1116, 2012. Disponível em: [bit.ly/2x9OY2d](http://bit.ly/2x9OY2d). Acesso em: 04 jun. 2019.

YU, F.; VOCK, D. M.; BARCLAY, T. R. Executive function: Responses to aerobic exercise in Alzheimer's disease. **Geriatric Nursing**, v. 39, n. 2, p. 219-224, 2018. Disponível em: [bit.ly/31Sg3Fd](http://bit.ly/31Sg3Fd). Acesso em: 04 jun. 2019.

ZENG, Z. *et al.* Effect of physical activity training on dementia patients: A systematic review with a meta-analysis. **Chinese Nursing Research**, v. 3, n. 4, p. 168-175, 2016. Disponível em: [bit.ly/2Fwy3eL](http://bit.ly/2Fwy3eL). Acesso em: 05 jun. 2019.